

ノ標本ガ2本貼ツテアツタ。其故 THUNBERG 氏ハおほえのころハ採集シテモ亦見テモ居ナカッタノデアル。序ニえのころぐさトあハトハ大變似テ居テ「あハえのころぐさカ又ハおほえのころカヲ栽培シテ變ツタモノデアラウ」ト云フノヲ屢々キクカラ其區別ヲ書イテ置カウ。あハニハ第4類即チ硬化シテキル類ノ内側ニ雄花ノ退化ニヨツテ出來タ小サナ *Palea*(花穎)ガ一個アルガえのころぐさニハナイ。之ガ兩種ノ區別點デアツテ本來別種デアル。

尙ホおほえのころト同日ニ見タノハささき^ビガ *Panicum paucisetum* STEUDEL デアルコト、いぬあハガ *Panicum chopdrachne* STEUDEL デアルコト、ハひぬめりガ *Panicum contractum* NEES ex STEUDEL デアルコトナドデアル。いぬあハトハひぬめりトハ本田博士ガ氣附イテ詳細ニ發表シテアルコト故繰返ス必要ハナイガささき^ビノ學名ハ次ノ様ニシナケレバナラス。

Panicum paucisetum STEUDEL, Syn. Glum. 52 no. 221 (1855).

Syn. *Setaria excurrens* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 275 (1866), excl. syn.; pro parte, syn. nov.

Panicum excurrens (non TRINIUS) FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, 161 (1876).

Panicum plicatum (non LAMARCK) HENRY in Trans. Asiat. Soc. XXIV Suppl. 106 (1896); MAKINO in Tokyo Bot. Mag. X 67 (1896), etc.

Panicum neurodes (non SCHULTES) HACKEL in Bull. Herb. Boiss. VIII, 644 (1899), 2 sér IV, 528 (1904), etc.

Setaria mariscus MATUDA in Tokyo Bot. Mag. XXIV, 173 (1910).

(和名) ささき^ビ

而シテ此基準標本ハ BUEGER 氏ノ九州デノ採集品デアル。ささき^ビノ名ニ屢々用キラレ又ハ用キラレタ *Panicum plicatum* LAMARCK, *Panicum neurodes* SCHULTES, *Panicum mauritianum* WILLDENOW ex SPRENGEL, *Panicum nepalensis* SPRENGEL, *Panicum nervosum* ROXBURGH, *Panicum excurrens* TRINIUS 等ハ皆日本領ニナイ禾本デアル。

又ハひぬめりノ學名ニ間違ヘテ用キラレタ *Panicum indicum* LINNEUS ノ原種ハ穂ノ長サガ 1 cm 弱ノモノデー見シテハひぬめりトハ見分ケラレル。

〇こきじのをごけ(小雛尾辭)ノ新産地(堀川芳雄)

昭和9年ニ筆者ニヨリ新種トシテ發表サレタこきじのをごけ(*Cyathophorella densifolia* HORIKAWA)ハ本州デハ伊勢國大内山ニ産スルコトガ報告サレテキタニ過ギナイ。今度、安藝ノ福王寺山、大和ノ大臺ケ原山並ニ入ノ波温泉、相州ノ元箱根ニモ本種ノ産スルコトガ明白トナツタ。ヨツテ原始林中ノ樹皮面ヲ仔細ニ探セバ更ニ廣ク各地ニ見ツカルデアラウト信ゼラレル。こきじのをごけ(*Cy. japonica* BROTH.)ヨリモ遙カニ小サク光澤ノ無い白黄綠色デ、葉ノ縁邊ニハ舷部(Saum)ガヨク發達シテキルノデ區別ハ容易デアル。